



Paper Type: Original Article

## Isolation, Cloning and Expression of T7 RNA Polymerase from T7 Bacteriophage in *E. coli*

Leyla Davarvash<sup>1</sup>, Maghsoud Pazhouhandeh<sup>\*1</sup> , Mohammad Ahmadabadi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Department of Biotechnology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran; \*(Associate Professor: Corresponding author: [pazhouhandeh@gmail.com](mailto:pazhouhandeh@gmail.com)).

**Citation:**

Davarvash, L., Pazhouhandeh, M. & Ahmadabadi, M. (2024). Isolation, cloning and expression of T7 RNA polymerase from T7 bacteriophage in *E. coli*. *The quarterly scientific journal of applied biology*, Volume 37 (Issue No. 1), PP. 28-39

Received: 2023.01.28

Accepted: 2023.11.26

### Abstract

**Introduction:** T7 RNA polymerase from T7 bacteriophage has suitable features for using in recombinant protein expression or transcription systems. This enzyme does not require additional factors to identify its promoter, operates very specific and only express the genes under T7 promoter. The features of T7 expression system make it important in biotechnology. Therefore, due to the increasing importance of this enzyme, its mass production at low cost is greatly important.

**Methods:** In this research, T7 phage was applied and PCR reaction was performed using T7 RNAPol-specific primers containing the cutting sites for restriction enzymes. After the electrophoresis of PCR product, T7 RNAPol gene and pGEX2TK plasmid were digested by *BamHI* and *EcoRI* enzymes and after being purified, the ligation was performed between them. The recombinant pGEX-T7RNAPol plasmid was transformed into the *E. coli*, by electroporation. Bacterial positive colonies containing the recombinant plasmid were selected using PCR.

**Results:** After confirming the obtained plasmids by PCR and digestion, they were sequenced and the sequence analysis confirmed the exact T7 RNA polymerase gene according to NCBI accession sequence. This recombinant plasmid was transformed into Rosetta strain of *E. coli* in order to express. Its positive colonies were selected and liquid culture was carried out. T7 RNAPol protein expression in bacteria was done by inducing with IPTG and after extraction, it was confirmed by SDS-PAGE.

**Conclusion:** This research is a prerequisite for T7 RNA Polymerase commercial and mass production that will be start after the optimization of its expression and purification methods.

**Keywords:** Expression System, T7 RNA Polymerase, T7 Bacteriophage, Transcription, Recombinant Proteins



## نوع مقاله: پژوهشی

جداسازی، همسانه سازی و بیان ژن RNA پلی مراز باکتریوفاژ T7 در باکتری *E. coli*لیلا داوروش<sup>۱</sup>، مقصود پژوهنده<sup>۲\*</sup>، محمد احمدآبادی<sup>۳</sup><sup>۱</sup>کارشناسی ارشد، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.<sup>۲</sup>دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.(\*نویسنده مسئول: [pazhouhandeh@gmail.com](mailto:pazhouhandeh@gmail.com))<sup>۳</sup>دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۹/۰۵

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

## چکیده

**مقدمه:** آنزیم RNA پلیمراز باکتریوفاژ T7، در رونویسی و بیان پروتئین های نوترکیب استفاده می شود. این آنزیم به فاکتور دیگری برای شناسایی پیشبر نیاز نداشته، بسیار اختصاصی عمل می کند و فقط ژن های تحت کنترل پیشبر T7 را بیان می نماید. این ویژگی ها موجب شده است که تولید آنزیم T7 RNA پلیمراز در بیوتکنولوژی بسیار پر اهمیت باشد.

**روش ها:** در این تحقیق، برای تولید انبوه و کم هزینه این آنزیم، سویه باکتریوفاژ T7 به عنوان الگو مورد استفاده قرار گرفت. واکنش PCR با استفاده از آغازگر های اختصاصی که حاوی سایت برشی برای آنزیم های EcoRI و BamHI بود انجام گرفت. پس از الکتروفورز محصول PCR، ژن تکثیر شده T7 RNA پلیمراز و پلاسمید pGEX2TK توسط این آنزیم ها برش داده شدند و پس از خالص سازی، واکنش لیگاسیون بین آن ها صورت گرفت. پلاسمید نوترکیب pGEX-T7RNAPol با الکتروپوراسیون به باکتری *E. coli* منتقل شد. گزینش باکتری های حاوی پلاسمید نوترکیب به کمک PCR انجام گرفت.

**یافته ها:** پس از تایید پلاسمید حاصل، با برش آنزیمی و همچنین با PCR، توالی یابی آن انجام و درستی آن مطابق توالی ثبت شده در NCBI تایید شد. پلاسمید نوترکیب به منظور بیان پروتئین مورد نظر به باکتری *E. coli* سویه Rosetta منتقل شد. کلني حاوی پلاسمید انتخاب و کشت شد. بیان پروتئین با القای IPTG در باکتری صورت گرفت و پس از استخراج به کمک SDS-PAGE تایید شد.

**نتیجه گیری:** این تحقیق پیش نیاز تولید تجاری و انبوه آنزیم T7 RNA پلیمراز است که پس از بهینه سازی بیان و خالص سازی پروتئین، تولید تجاری و بومی آن انجام خواهد شد.

---

کلیدواژه ها: آنزیم T7 RNA پلیمراز، باکتریوفاژ T7، پروتئین نوترکیب، رونویسی، سیستم بیانی

---

## مقدمه

علم بیوتکنولوژی ابزاری مهم برای انتقال ژن به منظور تولید پروتئین در سایر موجودات است. جداسازی یک ژن مهم مربوط به یک سلول یوکاریوٹی یا پروکاریوٹی و انتقال آن درون یک وکتور به منظور تکثیر یا بیان را همسانه سازی ژن می نامند. باکتری *Escherichia coli* یکی از اولین و متدالوں ترین میزبان‌های مورد استفاده برای تولید پروتئین‌های نوترکیب است. از جمله ویژگی‌های این باکتری، توانایی تکثیر سریع، بیان سریع و کشت آسان است. علاوه براین، در تولید مقدار بالای پروتئین نوترکیب و پذیرش ژن‌های بیگانه، قدرت بالایی دارد [1], [2]. تولید پروتئین‌های بزرگ اغلب در سلول‌های یوکاریوٹی انجام می‌گیرد، در مقابل، تولید پروتئین‌های کوچکتر در سلول‌های پروکاریوٹی مقرن به صرفه تر است. بیان پروتئین‌های کوچک در باکتری *E. coli* بسیار آسان بوده و از نظر اقتصادی کم هزینه تر است.

باکتریوفاز T7 از خانواده ویروسی *Podoviridae* است که باکتری‌های گرم منفی مثل باکتری *E. coli* را مورد حمله قرار می‌دهد. این نوع ویروس‌ها که به اصطلاح فاز نیز نامیده می‌شوند، تنها می‌توانند بطور اختصاصی سلول‌های باکتری خاص را مورد حمله قرار دهند. باکتریوفاز T7 به عنوان یک ویروس مدل در مطالعات زیست‌شناسی و ژنتیک مولکولی به کار گرفته شده است. فازها اساساً در ژنوم خود امکاناتی دارند تا بتوانند ژن‌های خود را در باکتری میزبان بیان نمایند و نیازهای خود را برآورده ساخته و تکثیر یابند. از این میان پیشبر یا پرومومتر T7 با توالی ۲۳ نوكلئوتیدی در این فاز شناسایی شده که قابلیت بیان در باکتری *E. coli* را دارد و در مهندسی ژنتیک هم به فور مورد استفاده قرار می‌گیرد. آنزیم T7 RNA پلیمراز (T7 RNAPol) برای اولین بار در سال ۱۹۷۰ از این باکتریوفاز جداسازی شد [3], [4]. این پروتئین از زمان کشف، به عنوان یک ابزار مهم برای بیان پروتئین نوترکیب در حال استفاده است [5]. ساختار اولیه این آنزیم در سال ۱۹۸۰ تعیین گردید [6] و بررسی ساختار کریستالی این آنزیم بوسیله اشعه ایکس مدل پیچیده‌ای را نشان داد که شباهت قابل توجهی بین دمین‌های این آنزیم و تعدادی دیگر از آنزیم‌های RNA پلیمراز و DNA پلیمراز از جمله DNA پلیمراز I باکتری *E. coli* و آنزیم Reverse Transcriptase نشان می‌داد [7]. آنزیم T7 RNA پلیمراز علاوه بر دمین پلیمریزاسیون، دارای دمین انتهای آمینی (N-terminal) است که در اتصال اختصاصی این آنزیم به توالی پرومومتر (T7) و باز کردن DNA دو رشته‌ای نقش دارد [8], [9]. با وجود شباهت بالا میان پیشبر T7 و T3، آنزیم T7 RNAPol تنها به پیشبر خود متصل می‌شود [10]. همچنین سرعت رونویسی آنزیم T7 RNAPol بакتریایی حدود هشت برابر بیشتر است [11]. خاتمه رونویسی توسط این آنزیم به سیگنال‌های ویژه‌ای نیاز دارد. این امر باعث شده است که آنزیم T7 RNAPol قادر به رونویسی از هر DNA ای نباشد و فقط رونویسی را در T7 DNA و ژن‌هایی که دارای پیشبر T7 است، خاتمه دهد و با توجه به اختصاصی عمل کردن آنزیم T7 RNA پلیمراز، این آنزیم نمی‌تواند ژنوم سلول‌های جانوری را رونویسی کند [12]. توالی پیشبر T7 عبارت است از:

5'-TAATACGACTCACTATAG

و توالی خاتمه دهنده رونویسی هم برای T7 RNA پلیمراز شامل توالی زیر است:

5'-ACTAGCATAACCCCTGGGGCCTCT AAACGGGTCTGAGGGGTTTTG-3'

اندازه آنزیم T7 RNAPol ۹۸ کیلو Dalton بوده و برای انجام عمل رونویسی، نیاز به پروتئین‌های کمکی و فاکتورهای رونویسی ندارد [13]. تمامی این ویژگی‌ها باعث شده است که استفاده از سیستم‌های بیانی بر پایه آنزیم T7 RNAPol از جایگاه مهمی در علم بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک برخوردار باشد. با وجود اینکه ایرادها و نواقصی برای این سیستم بیانی مطرح شده است، استفاده از سیستم‌های بیانی پیشرفته تر هیچ کدام به طور کامل جایگزین سیستم بیانی مبتنی بر T7 RNAPol نشده است و محققان سعی در برطرف کردن ایرادهای این سیستم بیانی دارند [2].

امروزه از آنزیم T7RNA پلیمراز استفاده‌های گسترده‌ای می‌شود. در انواع سیستم‌های بیان شونده از آنزیم T7RNA پلیمراز، پیشبر و خاتمه دهنده آن استفاده می‌شود. برای هرگونه سنتز RNA کافی است ژن مورد نظر در یک پلاسمید مقابل پیشبر T7 قرار داده

شود و سپس این پلاسمید به همراه بافر و rNTP آنزیم T7 RNA پلیمراز به مقدار فراوان RNA ژن مورد نظر را در مدت یک ساعت در ۳۷ درجه سانتیگراد تولید خواهد کرد. این روش جدید و مستقیم برای سنتز RNA روش ابروین (Eberwine) نامیده می شود که بر مبنای رونویسی در شرایط آزمایشگاهی به کمک پیشبر T7 و T7 RNA پلیمراز است. اساس بسیاری از کیت های سنتز RNA استفاده از این روش و آنزیم T7 RNA پلیمراز است. RNA های سنتز شده توسط آنزیم T7 RNA پلیمراز در مطالعه ساختار و عملکرد RNA در شرایط آزمایشگاهی، در آزمایشات هیریداسیون از جمله نورترن و ساترن بلات به عنوان پرورب، ریزآرایه، RNA مداخله گر (RNAi)، آزمایشات آنتی سنس و تلقیح و آلوده سازی برای ویروس های RNA دار استفاده می شوند [14]، [15]، [16]. جداسازی و خالص سازی این آنزیم از سلول های باکتری آلوده به باکتریوفاژ امکان پذیر نیست. زیرا بلافارسله بعد از ایجاد عفونت، مقدار کمی از این آنزیم تولید شده و لیز سلول باکتری انجام می شود. بنابراین با همسانه سازی ژن این آنزیم در یک پلاسمید مناسب و انتقال آن به داخل سلول میزبان می توان مقدار بالایی از این آنزیم را تولید نمود [17]. با توجه به اهمیت آنزیم T7 RNAPol در بیوتکنولوژی، در این تحقیق به جداسازی ژن T7 RNAPol از باکتریوفاژ T7 و طراحی و ساخت وکتور بیانی مناسب برای بیان آن اقدام شد. این تحقیق در حقیقت پیش-زمینه ایجاد خط تولید تجاری آنزیم T7 RNAPol است.

## مواد و روش‌ها

در این تحقیق ژن T7 RNA Polymerase از DNA باکتریوفاژ T7 جداسازی و داخل یک پلاسمید بیان در باکتری همسانه سازی شد تا مقدمات تولید تجاری آن فراهم شود. برای این کار، DNA باکتریوفاژ T7 (سیگما M-69390) جهت کلون کردن ژن T7 پلی مراز (GenBank: M38308.1) به طول ۲۸۷۷ نوکلئوتید مورد استفاده قرار گرفت.

### آغازگرهای الیگو دئوكسی نوکلئوتیدی (پرایمرها)

آغازگرهای به کار برده شده برای انجام PCR به منظور کلون کردن ژن T7 RNA پلی مراز باکتریوفاژ T7 از طریق نرم افزار (APE) (APE) طراحی و ساخته شد (Eurogentec). توالی آغازگر Forward (BamHI) به صورت 5'-aaGAATTCTtacgcgaacgcgaaatcgcta- 3' و توالی آغازگر Reverse (EcoRI) به صورت 3'-aaGGATCCatgaacacgattaaatcgct- 5' بود. سایت های برشی تعییه شده بر روی این آغازگرهای با زیرخط مشخص شده است. آغازگرهای مورد استفاده برای توالی یابی دقیق ابتدا و انتهای ژن داخل پلاسمید که به دوطرف محل ورود روی پلاسمید می چسبند عبارتند از:

pGEXR: AGCTGCATGTGTCAGAGGTT و pGEX F: CAATGTGCCCTGGATGCGTTC

### پلاسمید

در مطالعه حاضر، ژن T7RNA پلیمراز، به پلاسمید pGEX2TK منتقل شد. این پلاسمید حاوی پرومотор lac و tac است. بیان ژن LacZ و GST به کمک این پلاسمید امکان پذیر است. این پلاسمید ژن مقاومت به آنتی بیوتیک آمپی سیلین را جهت گزینش در باکتری *E. coli* دارد. به کمک این پلاسمید می توان پروتئین های بیان شده در شرایط آزمایشگاهی را از طریق اتصال به پروتئین GST روی ستون سفارز خالص سازی کرد [18].

### نژاد باکتری

در این پژوهه از باکتری *E. coli* Top10 و نژاد های Rosetta به ترتیب برای انجام همسانه سازی و بیان پروتئین T7 RNA پلی مراز استفاده شد.

### تکثیر با PCR و همسانه سازی پلاسمید نوترکیب

تکثیر قطعه DNA به کمک آغازگرهای اختصاصی در دستگاه ترموسایکلر بیوراد انجام شد. مواد واکنش PCR (در حجم ۲۰ میکرولیتر) شامل: یک میکروولیتر ۱۰ میلی مولار، یک میکروولیتر ۵۰ میلی مولار، یک میکروولیتر از هر کدام از آغازگرهای با غلظت ۱۰ میکرومولار، ۳۰۰-۱۰۰ نانوگرم از DNA الگو به همراه بافر PCR و آنزیم Mag Taq DNA polymerase و آب مقطر استریل بود. پس از تست دماهای مختلف چسبیدن آغازگرهای در چرخه های PCR به کمک گرادرینت PCR، تکثیر موفق ژن T7 RNA پلیمراز در دماهی چسبیدن آغازگرها ۶۰ درجه سانتی گراد برای جفت آغازگرهای اختصاصی این ژن، با ۳۵ چرخه از روی DNA باکتریوفاژ T7 صورت گرفت. پس از خالص سازی محصول PCR، محلول تخلیص شده به همراه پلاسمید pGEX2TK استفاده از آنزیمهای EcoRI (Fermentas-Anza) و BamHI در حجم ۱۰۰ میکروولیتر برش یافته و قطعات مورد نظر در روی ژل آگارز LMP جداسازی و دوباره خالص سازی شدند. در نهایت ژن T7 RNA پلیمراز در پلاسمید pGEX2TK با کمک آنزیم T4 DNA Ligase قرار گرفت. محصول لیگاسیون با الکتروپوراسیون ۲/۵ کیلو ولت به مدت ۵ هزارم ثانیه داخل سلول های شایسته باکتری E. coli نژاد Top10 قرار گرفت و روی محیط کشت حاوی آمپی سیلین (۱۰۰ میلیگرم در لیتر) انتخاب کلنی ها صورت پذیرفت. ۱۲ کلنی با انجام colony PCR انتخاب شد و کشت مایع صورت گرفت تا پلاسمید آنها استخراج گردد. استخراج پلاسمید با روش miniprep انجام و پلاسمیدها دوباره با PCR تایید شدند و پس از انجام تیمار Rnase پلاسمیدهای نوترکیب pGEX-T7RNAPol برای توالی یابی (دانشگاه Lille فرانسه) ارسال شدند.

## بيان و استخراج پروتئين

پس از تایید توالی پلاسمیدهای نوترکیب pGEX-T7RNAPol ، یکی از این پلاسمیدها به روش الکتروپوراسیون با ۲/۵ کیلو ولت به مدت ۵ هزارم ثانیه به سویه بیانی Rosetta انتقال داده شد و پس از ظهر کلنی ها روی محیط حاوی آمپی سیلین، یک کلنی در محیط مایع LB حاوی آمپی سیلین، به مدت یک شب و در دماهی ۳۷°C کشت شد. محیط اصلی LB مایع حاوی آمپی سیلین، به حجم ۵۰۰ میلی لیتر با ۱ میلی لیتر از پیش کشت تلقیح شد و پس از رسیدن تراکم کشت به  $OD_{600} = 0.6/8$  القا با IPTG به غلظت نهایی ۱ میلی مولار انجام شد. پس از گذشت ۶ ساعت از القاء، کشت باکتری به مدت ۱۵ دقیقه با سرعت ۵۰۰۰ rpm در دماهی ۴۰°C سانتریفیوژ شد. محیط کشت حذف و سلول ها داخل بافر استخراج پروتئین سوسپانسیون شدند. عملیات سونیکاسیون التراسونیک (Bandelin) بر روی محلول موجود صورت گرفت. با تنظیم ۴۰ درصد نیترو برای دستگاه، در طی سیکل های زمانی ۱۵ ثانیه ای و تعداد ۱۰ ضربه یا پالس صوتی وارد شد تا سلول های باکتری شکسته شوند. جهت جلوگیری از تخریب گرمایی، تمامی مراحل سونیکاسیون بر روی پلاسمید خالی فاقد ژن نیز صورت گرفت. پروتئین حاصل با استون ۱۰۰ درصد و نگهداری به مدت ۱۵ دقیقه با سرعت ۱۴۰۰۰ rpm در دماهی ۴۰°C انجام شد. همزمان و در موازات، کشت، و به عنوان کنترل منفی، القا و سونیکاسیون روی نمونه باکتری حاوی پلاسمید خالی فاقد ژن نیز صورت گرفت. پروتئین حاصل با استون ۱۰۰ درصد و نگهداری به مدت ۲ ساعت در ۷۰°C- با سانتریفیوژ ۱۴۰۰۰ rpm یافته و بعد از شستشو با استون ۸۰ درصد در نهایت داخل ۳۰ میکرولیتر بافر PAGE محلول شد. قبل از انجام الکتروفورز پروتئین، نمونه ها به مدت ۵ دقیقه در دماهی ۹۵°C حرارت داده شده و آماده برای بارگذاری روی ژل شدند.


## الکتروفورز پروتئین در ژل آکریل آمید

سیستم SDS PAGE استفاده شده در این پروژه ناپیوسته، یک بخش Stacking که پروتئین ها در آن متراکم و متراکم می شوند و یک بخش Resolution که پروتئین ها در آن بر اساس وزن مولکولی خود جدا می شوند، بود. ابتدا ژل پایین ۹ درصد تهیه و در قالب شیشه ای ریخته شد و سپس ژل بالا ۵ درصد نیز آماده و ریخته شد. مقدار ۱۵ میکرولیتر از هر کدام از نمونه ها درون چاهک ها ریخته شد. پس از برقراری جریان الکتریکی با تنظیم آمپر دستگاه روی ۳۰-۳۰ mA و ولتاژ روی ۱۴۰، با رسیدن رنگ نشانگر (برموفنل بلو) به انتهای ژل بالا که حدود ۱ ساعت طول کشید، این تنظیمات برای ژل پایین به صورت تنظیم آمپر دستگاه روی ۵۰-۳۰ mA و ولتاژ روی ۱۰۰ ولت تغییر کرد. بعد از گذشت حدود ۴ ساعت، با رسیدن رنگ به انتهای ژل پایین، با قطع جریان، ژل از قالب های شیشه ای جدا و با محلول کوماسی بلو رنگ آمیزی و سپس با اسید استیک ۱۰ درصد رنگبری شد.

## نتایج و بحث

### همسانه سازی ژن T7 RNA پلیمراز در پلاسمید pGEX2TK

ابتدا با استفاده از توالی ثبت شده ژن T7 RNA پلیمراز، آغازگرهای اختصاصی آن طراحی و با کمک PCR پس از بهینه سازی شرایط دمایی، از روی DNA فاز تکثیر شد. در شکل A، تصویر الکتروفورز محصول PCR نشان داده شده است. محصول PCR خالص سازی شده به همراه پلاسمید pGEX2TK با آنزیم های برشی *EcoRI* و *BamHI* برش داده شدند. پس از تایید صحت برش ها، به منظور کلون کردن ژن T7 RNA پلی مراز، مقدار یک میکرولیتر از پلاسمید و چهار میکرولیتر از ژن برای واکنش لیگاسیون مورد استفاده قرار گرفت. پس از انجام واکنش لیگاسیون به مدت یک شبانه روز در دمای 16 درجه سانتیگراد، به ازاء هر بار ترانسفورماتیون *E. coli* به روش الکتروپوراسیون، یک میکرولیتر از محصول واکنش لیگاسیون استفاده شد. نتیجه نشان دهنده رشد تعدادی کلني بر روی محیط گرینشی بود. هیچ کلني در کنترل منفی رشد نکرد، اما کلني های زیادی در کنترل مثبت رشد کرده بودند که این نتایج، صحت انتقال را به باکتری های مستعد تایید کرد. در مرحله بعد برای تایید نوترکیب بودن پلاسمید در کلني های رشد کرده در محیط، واکنش PCR با آغازگرهای اختصاصی ژن T7 RNA پلیمراز و شرایط مشابه اولیه، بر روی 16 عدد از این کلني های رشد یافته، انجام شد. با بارگذاری محصول PCR، باند به اندازه 2877 جفت باز، نوترکیب بودن پلاسمید در برخی کلني های انتخاب شده را تایید کرد (شکل B).




شکل ۱- (A) تصویر الکتروفورز محصول PCR، تکثیر ژن T7 RNA پلی مراز با آغازگرهای اختصاصی مربوط به ژن T7 RNAPol روی ژل آگارز ۱ درصد. باند جفت بازی با اندازه مورد انتظار برای ژن T7 RNAPol مطابقت داشت. M: مارکر ، ۱ و ۲: محصول PCR (B) تصویر الکتروفورز محصول PCR روی کلني ها با آغازگرهای اختصاصی ژن T7 RNA پلی مراز، شماره ۱۶: کنترل مثبت (PCR اولیه)

Figure 1- A) Electrophoresis image of PCR product, amplification of T7 RNA polymerase gene with specific primers related to T7 RNAPol gene on 1percent agarose gel. The 2877 bp band corresponded to the expected size for the T7 RNAPol gene. M: Marker, 1 and 2: PCR product. ) Electrophoresis image of PCR product on colonies with specific primers of T7 RNA polymerase gene, number 16: Positive control (initial PCR)

### تایید همسانه سازی ژن T7 RNA پلیمراز در پلاسمید pGEX2TK با روش های PCR و برش آنزیمی

برای تایید پلاسمید نوترکیب حاوی ژن T7 RNA پلی مراز در کلني های رشد یافته روی محیط گرینشی آمپی سیلین، استخراج پلاسمید از آنها کلني های شماره ۱ و ۲ و ۳ و ۷ مشخص شده در شکل ۱ انجام شد. در مرحله بعد با انجام واکنش PCR با آغازگرهای ژن T7 RNA پلی مراز روی این پلاسمیدهای استخراج شده، درستی پلاسمید نوترکیب بررسی شد (شکل A). همچنین، پلاسمیدهای نوترکیب، توسط آنزیم های برشی *EcoRI* و *BamHI* برش داده شدند. بر اساس نقشه فیزیکی قابل پیش بینی برای پلاسمید نوترکیب انتظار می رفت که دو قطعه با اندازه های 2877 و 4969 جفت باز ایجاد شوند. با توجه به تشکیل دو قطعه پیش بینی شده از برش آنزیمی، پلاسمید نوترکیب حاصل تایید گردید (شکل B). شکل C، تصویر نهایی تهیه شده پلاسمید نوترکیب با استفاده از نرم افزار LazerGene را نشان می دهد.



شکل ۲- (A) تصویر الکتروفورز محصول PCR با آغازگرهای اختصاصی ژن T7 RNA پلی مراز روی پلاسمیدهای استخراج شده از کلنی های مثبت شماره ۳ و ۷، شماره ۱ و ۲: PCR روی پلاسمید های خالی، C: کنترل منفی بدون PCR (T7 RNAPol ژن PCR)، C+: کنترل مثبت (PCR ژن T7 RNAPol مارکر SM0321 ThermoScientific). (B) برش آنزیمی پلاسمید نوترکیب برش نیافته، ۱: پلاسمید نوترکیب برش SM0321 ThermoScientific. M: مارکر pGEX-T7RNAPol، ۲: اندازه ۲۸۷۷ bp T7 RNAPol به اندازه ۲۸۷۷ bp، ۳: مارکر. (C) درج قطعه ژن T7 RNA پلی مراز با آنزیم های برشی EcoRI و BamHI و خروج قطعه ژن T7 RNAPol به اندازه ۲۸۷۷ bp، M: مارکر. (D) درون وکتور pGEX2TK طی واکنش همسانه سازی تهیه شده با نرم افزار LazerGene

**Figure 2- A)** Electrophoresis image of PCR product with specific primers of T7 RNA polymerase gene on plasmids extracted from positive colonies No. 3 and 7, No. 1 and 2: PCR on non-recombinant plasmids, C-: Negative control (without DNA), C+: positive control (PCR of T7 RNAPol gene), M: marker SM0321 ThermoScientific. **B)** Enzymatic digestion of recombinant plasmid pGEX-T7RNAPol, 1: recombinant plasmid without digestion. No. 3 and 7: digestion with BamHI and EcoRI enzymes and removal of T7 RNAPol gene fragment of 2877 bp, M: marker **C)** Insertion of T7 RNA polymerase gene into pGEX2TK vector by cloning. Image prepared with LazerGene software


## نتایج توالی یابی

برای بررسی درست بودن توالی ژن کلون شده داخل پلاسمید، نمونه پلاسمید نوترکیب pGEX-T7RNAPol تایید شده (شماره ۳ و ۷) پس از انجام تیمار RNase برای تعیین توالی به دانشگاه Lille فرانسه ارسال گردید. توالی های ثبت شده در NCBI برای ژن T7 RNAPol با شماره دستیابی M38308 با نتایج حاصل از توالی یابی، با استفاده از دو نرم افزار آنلاین BLAST و Multalin مقایسه گردید. نتیجه حاصل از توالی یابی پلاسمیدهای ۳ و ۷ صحت و تطبیق کامل توالی را با نمونه ثبت شده در NCBI برای ژن T7 RNAPol نشان داد. به کمک آغازگرهایی که به دو طرف محل ورود ژن در پلاسمید می چسبند توالی یابی های تکمیلی برای ابتدا و انتهای ژن انجام شد و درست بودن توالی ژن و پیوستگی درست توالی پلاسمید با ژن که لازمه بیان درست اسید آمینه های ژن بصورت فیوزن با GST در این پلاسمید ثابت گردید (شکل ۳). توالی های سایت های برشی آنزیم ها بلا فاصله قبل و بعد از ژن به درستی مشاهده می شوند.

## بیان پروتئین نوترکیب pGEX-T7RNAPol در باکتری


پس از تایید پلاسمیدهای نوترکیب، یکی از پلاسمیدهای نوترکیب در موازات پلاسمید خالی pGEX2TK به باکتری های مستعد سویه بیانی از Rosetta E.coli به روش الکتروپوراسیون منتقل شد و در محیط LB حاوی آنتی بیوتیک آمپی سیلین، کشت داده شدند. پس از انتخاب کلنی های مثبت و تایید مجدد با PCR به منظور استخراج پروتئین از سلول مورد نظر، پیش کشت مایع و سپس کشت اصلی صورت گرفت و پس از پایان یافتن زمان القا با IPTG محیط کشت حذف و بعد از سونیکاسانیون پروتئین باکتری ها استخراج و با استون رسوب داده شد. در نهایت به رسوب ته تیوب ۳۰ میکرومتری باfer PAGE افزوده شد. نتیجه الکتروفورز پس از رنگ آمیزی با کماسی بلو نشان داد که ژن T7 RNA پلی مراز در این پلاسمید و در این سویه باکتری بخوبی بیان شده است. چون این پروتئین در این پلاسمید pGEX2TK بصورت فیوزن با GST تولید می شود لذا وزن مولکولی آن (۹۷ کیلو دالتون) به اندازه حدود ۲۴ کیلو دالتون بیشتر شده و در محدوده ۱۲۰ کیلو دالتون دیده می شود (شکل ۴).

دادروش و همکاران / جداسازی، همسانه سازی و بیان زن RNA پلی مراز باکتریوفاژ T7 در باکتری E.coli



شکل ۳- زیرهم چینی توالی ادغام شده حاصل از توالی یابی های متعدد روی پل‌اسمید نوتکیپ ایجاد شده و pGEX2TK-T7RNAPol

Figure 3- The alignment of combined sequences resulting from multiple sequencing on the recombinant plasmid pGEX2TK-T7RNAPol and the published gene sequence with accession number M38308



شکل ۴- تصویر الکتروفورز پروتئین روی ژل آکریل آمید ۹ درصد. باند مربوط به پروتئین T7 RNAPol برای پلاسمید حاوی ژن T7 RNA Pol با تعداد اسیدآمینه ۲۲۰+۸۸۴ در چاهک چپ قابل مشاهده است. چاهک وسط: باند پروتئینی به وزن مولکولی تقریباً ۲۴ کیلوودالتون برای پلاسمید خالی pGEX2TK که فقط GST با حدود ۲۲۰ اسیدآمینه دارد. (M: مارکر آزمایشگاهی پروتئین)

**Figure 4- Image of protein electrophoresis on 9 percent acrylamide gel. The T7 RNAPol protein band with a molecular weight of 120 kDa is visible for the plasmid containing the T7 RNAPol fusion gene with GST with 884+ 220 amino acids in left and negative control in the middle is a protein band with a molecular weight of approximately 24 kDa for the empty pGEX2TK plasmid which contains only GST with 220 amino acids. (M: Lab Pr. Marker)**

T7 RNA پلیمراز، سنتز RNA را در حضور DNA الگو انجام می‌دهد. شناسایی اختصاصی پرموتور، ساختار ساده آنزیم، فعالیت مستقیم بدون نیاز به کوفاکتورها و دامنه میزانی گسترده آن، میزان استفاده از این آنزیم را افزایش داده است. تمام این ویژگی‌ها باعث شده که این پلیمراز به عنوان یک ابزار مهمی برای تحقیقات مختلف باشد و بررسی‌های فیزیکی و شیمیابی روی عملکرد رونویسی و RNA را آسانتر سازد. در یک تحقیق، همسانه سازی و انتقال ژن آنزیم T7 RNA پلیمراز به هسته سلول‌های یوکاریوتویی و تولید آن در گیاه توتون انجام گرفت. آغازگرهای مناسب از روی توالی ژن T7 RNA پلیمراز به همراه توالی‌های مناسب برای آنزیم‌های برشی، طراحی و ژن T7 RNA پلیمراز مورد نظر پس از جداسازی در وکتور بیانی pCAMBIA1304 همسانه سازی و سپس، وکتور نوترکیب به کمک سویه LB4404 آگروباکتریوم به گیاهان توتون منتقل شد. حضور و بیان ژن T7 RNA پلیمراز در گیاهان ترا ریخته با روش‌های PCR و RT-PCR تأیید شد [19]. همچنین گزارشی مبنی بر استفاده از سیستم آنزیم T7 RNA پلیمراز برای تولید و بیان آنتی بیوتیک‌هایی مانند Streptomycin وجود دارد. این سیستم در تولید آنتی بیوتیک‌های مهم بسیار حائز اهمیت است [20].

در یک گزارش، برای افزایش میزان بازده تولید RNA سنتزی، از شرایط ویژه رونویسی، مانند بافر رونویسی با عملکرد بالا، استفاده شده است. این شرایط ویژه از تولید محصولاتی که باعث مهار آنزیم T7 RNA پلیمراز می‌شود، جلوگیری کرده و در نتیجه باعث افزایش کیفیت RNA سنتزی شد [17]. از سیستم بیانی T7 RNAPol، در بیان و تولید پروتئین‌های نوترکیب در مخمرها و سلول‌های جانوری نیز استفاده می‌شود [21]. در یک تحقیق، بیان پروتئین فلورسنت سبز (GFP) تحت سیستم بیانی T7 RNAPol در پروتوبلاست توتون مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق نشان داد که انتقال T7-pol به سیتوپلاسم سلول می‌تواند در بیان بیش از حد (RNA over-express) های مورد نظر در سیتوسل سلول نقش داشته باشد [22].

سیستم بیانی باکتریوفاژ T7 دارای یکی از برجسته‌ترین سیستم‌های رونویسی مورد استفاده در بیوتکنولوژی است. اما سیستم خاتمه دهنده رونویسی در T7 در حالت طبیعی ضعیف است. در یک تحقیق، توالی‌هایی را طراحی و مهندسی کردند که فعالیت ساختار سنجاق سر ترمیناتور تقویت شود و در نتیجه سیستم خاتمه دهنده رونویسی عملکرد بالاتری داشته باشد. از این سیستم همچنین، برای تقویت سیستم رونویسی باکتری *E. coli* هم استفاده شد [23].

RNA پلیمراز باکتریوفاژ T7، از زمان کشف به عنوان یک مدل برای درک سنتز RNA و همچنین یک ابزار مهم برای بیان پروتئین‌ها، شناخته می‌شود. درک سازوکارهای اساسی تنظیم T7 RNAPol برای طراحی فاکتورهای رونویسی مبتنی بر T7، که می‌توانند در طراحی سیستم‌های بیان ژنی استفاده شوند، بسیار اهمیت دارد. در یک تحقیق، برای کشف مکانیزم‌های تنظیم بیان ژن توسط T7 RNAPol یک روش سریع و مفروض به صرفه برای شناسایی عواملی را که بر روی فعالیت‌های رونویسی تاثیر می‌گذارند معرفی کردند. در این تحقیق از یک سیستم به نام سیستم تنظیم تتراسایکلین (Tetracycline regulatory system :tet) استفاده شد. در سیستم tet، زمانیکه پروتئین مهارکننده تتراسایکلین (tetR) به توالی اپراتور (tetO) متصل می‌شد، فعالیت رونویسی کاهش می‌یافت. از سیستم tet برای طراحی سیستم‌های بیان ژنی استفاده می‌شود [24].

پروتئین‌های غشایی حدود ۵۰ درصد از اهداف کشف دارو را نشان می‌دهد. بیان و تولید بیش از حد پروتئین‌های غشایی در ژنومیک ساختاری و بیوتکنولوژی بسیار اهمیت دارد. با وجود سیستم‌های بیانی یوکاریوتی، باکتری‌ها ابزاری مفروض به صرفه و قدرتمند برای تولید پروتئین هستند. سیستم بیانی مبتنی بر T7 RNAPol یک سیستم بیانی موفق و کارآمد است که به تولید مقدار بالایی از پروتئین‌ها کمک می‌کند. برای ایجاد این سیستم بیانی، ژن T7 RNAPol تحت کنترل پرومودر Lac UV5 داخل ژنوم باکتریوفاژ Lambda طراحی و سپس تحت پرومودر T7 در پلاسمید بیانی همسانه سازی می‌شود. با اضافه شدن IPTG، آنزیم T7 RNAPol به میزان بالایی تولید شده و ژن هدف را رونویسی می‌کند [25].

در یک تحقیق، یک مکانیسم تنظیمی جدید برای سیستم بیان T7 را گزارش دادند. در این تحقیق از دو میزان باکتریابی به نام C45(DE3) و C44(DE3) جهش یافته استفاده شد. در این میزان‌ها تحت شرایط القایی، میزان mRNA مورد نظر ده برابر کمتر از سویه والدینی بود و همین امر منجر به تجمع کندر پروتئین هدف می‌شد. در نتیجه تجمع پروتئین هدف در این میزان‌ها به تاخیر افتاده و کنترل مقدار پروتئین هدف آسانتر گردید. بر پایه این سیستم، اتصال پروتئین فلورستن دار (GFP) به پروتئین‌های غشایی تولید شده، بررسی کیفیت و بازدهی آن‌ها را آسان تر می‌کند. این میزان‌های جهش یافته، مکمل دیگر میزان‌های T7 موجود هستند و قابلیت انعطاف پذیری سیستم بیان T7 را افزایش می‌دهد [26].

در سیستم بیانی T7 RNAPol تحت پرومودر LacUV5، آنزیم T7 RNAPol به میزان بالایی تولید شده و همین امر موجب مرگ سلولی می‌شود. یکی دیگر از سیستم بیانی، قرارگیری RNAPol T7 در کروموزوم باکتری است که حتی در برخی دیگر از موجودات نیز استفاده شده است. در این سیستم، نیازی به تولید بیش از اندازه آنزیم نیست و تنها یک نسخه از آنزیم T7 RNAPol کافیست تا مقدار مورد نظر پروتئین هدف بیان و تولید شود. اما ارزیابی کارایی و عملکرد و بیان پروتئین در این سیستم بسیار وقت گیر و پرهزینه است [27]. در نتیجه امروزه، استفاده از سیستم بیانی پلاسمید محور (PDT7: plasmid-driven T7RNAP) جایگاه بسیار مهمی در علم بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک دارد. اساس سیستم بیانی PDT7 بر پایه پلاسمید است و دستکاری ژنتیکی روی پلاسمید ساده‌تر است. همین امر موجب شده است که سیستم PDT7 نسبت به بیان از روی کروموزوم کاربردی‌تر باشد. یکی از کاربردهای مهم سیستم بیانی PDT7، تولید بیوسنسورهای سلولی است [28].

در سال ۲۰۲۱ در یک تحقیق، از سیستم بیانی T7 RNAPol برای تولید آنزیم گلوکز دهیدروژناز (GDH) در میزان باکتری *E. coli* سویه BL21 (DE3) استفاده شد. سویه مهندسی شده باکتری *E. coli* در این تحقیق، براحتی با سرکوب لیز خودکار سلولی، تولید پروتئین‌های نوترکیب را افزایش داد و یک روش کارآمد را به علم بیوتکنولوژی صنعتی معرفی کرد [29].

## نتیجه‌گیری

آنزیم T7 RNA پلیمراز یکی از مهم ترین و پرکاربردترین آنزیم های مورد استفاده در محیط های آزمایشگاهی است. این آنزیم در سنتز RNA برای تولید پروب در نودرن بلاست، کیت های سنتز RNA، تولید guideRNA برای استفاده در سیستم CRISPR و همچنین آلوده سازی ویروس های RNA دار که داخل پلاسمید به صورت DNA نگهداری و تکثیر می شوند، استفاده می شود [30]. به طور معمول تولید این آنزیم نوترکیب به سیستم های میکروبی وابسته است. همچنین کیت های تجاری این آنزیم گران قیمت و وارداتی است. برای فروش این آنزیم به همراه بافر آن، شرکت هایی مثل تاکارا برای ۲۰ واکنش سنتز RNA قیمت ۲۰۸ یورو، شرکت بیوسرج لب برای ۵۰ هزار یونیت آنزیم قیمت ۱۴۴ یورو و شرکت NebBioLab برای ۵۰ واکنش سنتز RNA قیمت ۳۵۰ یورو پیشنهاد می کنند. بنابراین با توجه به اهمیت روزافزون این آنزیم در پژوهش های بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی، تولید انبوه و کم هزینه آن در داخل کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق بر روی جداسازی و همسانه سازی ژن T7 RNA پلیمراز به منظور تولید آنزیم، تلاش شد. در مرحله اول ابتدا با استفاده از توالی ژن T7 RNA پلیمراز با کد دستری M38308 دو آغازگر رو به جلو و رو به عقب برای دو انتهای توالی ژن طراحی شد. با استفاده از تکنیک PCR توالی ژن T7 RNA پلیمراز از باکتریوفاژ T7 جداسازی شد. پس از برش دو انتهای قطعه ژن با آنزیم های برشی، پلاسمید pGEX2TK نیز دقیقاً با همان آنزیم های برشی برش داده شد تا انتهایهای ایجاد شده توسط آنزیم T4 DNA Ligase محصلو لیگاسیون به روش الکتروپوراسیون به سلول های مستعد منتقل شد و پس از استخراج از کلونی ها و تایید آن به کمک روش PCR و برش آنزیمی و توالی یابی، ناقل ایجاد شده pGEX-T7RNAPol نام گذاری شد. در ادامه با انتقال پلاسمید حاصل به سویه بیانی باکتری و با کاربرد IPTG توانستیم توسط روش SDS PAGE باند پروتئینی ۱۲۰ کیلو Dalton مربوط به فیوژن این پروتئین با GST را مشاهده کنیم. این تحقیق پیش زمینه و تحقیق زیربنایی برای ایجاد خط تولید این آنزیم در ایران است که برای اولین بار جهت استقلال در تولید و سهولت در دستری و پایین آوردن قیمت آن برای استفاده در تمام آزمایشگاه های بیوتکنولوژی و ژنومیک انسانی، جانوری، گیاهی و میکرو ارگانیسم ها انجام می شود.

## اعلام تعارض منافع

نویسندهای این مقاله اعلام می کنند که در رابطه با انتشار مقاله ارائه شده به طور کامل از اخلاق نشر تبعیت کرده و از سرقت ادبی، سوء رفتار، جعل داده ها و یا ارسال و انتشار دوگانه، پرهیز نموده اند و منافعی تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندهای در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت ننموده اند. نویسندهای اظهار می کنند که هیچگونه تعارض منافع بین آنها وجود ندارد و اصالت محتوای مقاله تایید می شود.

## سپاسگزاری

از حمایت های مادی و معنوی معاونت پژوهشی و گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تشکر و قدردانی می شود.

## منابع

- [1] Terpe, K. (2006). Overview of bacterial expression systems for heterologous protein production: from molecular and biochemical fundamentals to commercial systems. *Applied microbiology and biotechnology*, 72, 211-212.
- [2] Overton, TW. (2014). Recombinant protein production in bacterial host. *Drug Discow*, 19 (5), 590-601.
- [3] Chamberlin, M., McGrath, J., Waskell, L. (1970). New RNA polymerase from Escherichia coli infected with bacteriophage T7. *Nature*, 228, 227-228.
- [4] Chamberlin, M., Ring, J. (1973). Characterization of T7-specific ribonucleic acid polymerase I. General properties of the enzymatic reaction and the template specificity of the enzyme. *Journal of Biological Chemistry*, 248, 2235-2244.
- [5] Tabor, S. (2001). Expression using the T7 RNA polymerase/promoter system. *Curr. Protoc. Mol. Biol., Chapter 16*, Unit16.2.
- [6] Moffatt, BA., Dunn, JJ., Studier, FW. (1984). Nucleotide sequence of the gene for bacteriophage T7 RNA polymerase. *Journal of molecular biology*, 173, 265-269.

- [7] Cheetham, GM., Jeruzalmi, D., Steitz, TA. (1999). Structural basis for initiation of transcription from an RNA polymerase–promoter complex. *Nature*, 399, 80-81.
- [8] Sousa, R., Chung, YJ., Rose, JP., Wang, BC. (1993). Crystal structure of bacteriophage T7 RNA polymerase at 3.3 Å resolution. *Nature*, 364, 593-594.
- [9] Sousa, RJ., Mukherjee, S. (2003). T7 RNA polymerase. *Progress in nucleic acid research and molecular biology*, 73, 1-14.
- [10] Jorgensen, ED., Durbin, RK., Risman, SS., McAllister, W. (1991). Specific contacts between the bacteriophage T3, T7, and SP6 RNA polymerases and their promoters. *Journal of Biological Chemistry*, 266, 645-651.
- [11] Miroux, B., Walker, J.E. (1996). Overproduction of proteins in Escherichia coli: mutant hosts that allow synthesis of some membrane proteins and globular proteins at high levels. *Journal of molecular biology*, 260 (3), 289-298.
- [12] Song, H., Kang, C. (2001). Sequence-specific termination by T7 RNA polymerase requires formation of paused conformation prior to the point of RNA release. *Genes to Cells*, 6, 291-301.
- [13] Tunitskaya, V., Kochetkov, S. (2002). Structural–functional analysis of bacteriophage T7 RNA polymerase. *Biochemistry*, 67, 1124-1135.
- [14] Pamela, R., Duschl, J., Klaus, R. (2004). Optimized RNA amplification using T7-RNA-polymerase based in vitro transcription. *Anal Biochem*, 334, 164-174.
- [15] Novak, PK., Lee, JS., Mikaelyan, A., Patel, V., and Thorgeirsson SS. (2004). Oligonucleotide microarray analysis of aminoallyl-labeled cDNA targets from linear RNA amplification. *BioTechniques*, 37, 580-588.
- [16] Russell, S., Meadows, LA., and Roslin, RR. (2008). Microarray Technology in Practice. 464-465.
- [17] Nilsen, TW., Rio, DC., Ares, M. (2013). High-yield synthesis of RNA using T7 RNA polymerase and plasmid DNA or oligonucleotide templates. *Cold Spring Harbor Protocols*, 11, pdb.prot078535.
- [18] Pazhouhandeh, M., Dieterle, M., Marrocco, K., Lechner, E., et al. (2006). F-box-like domain in the Polerovirus protein P0 is required for silencing suppressor function. *PNAS*, 103 (6), 1994-1999.
- [19] Nalbandi, K., Mirzaie, A., Khodaei, L., Khodakaramian, G. (2017). Cloning and Transformation of Bacteriophage T7 RNA Polymerase in Tobacco. *Genetic Engineering and Biosafety Journal*, 5, 67-75.
- [20] Wei, J., Tian, J., Pan, G., Xie, J., Bao, J., Zhou, Z. (2017). Development and application of a T7 RNA polymerase-dependent expression system for antibiotic production improvement in Streptomyces. *Biotechnology letters*, 39, 857-864.
- [21] Cheng, H., Dufu, k., Lee, C., Dias, A. (2006). Human mRNA export machinery in recruited of the 5' end of mRNA. *Cell*, 127, 1389-1400.
- [22] Sheen, H., & White, KA. (2018). Expression of T7-based constructs in tobacco cells. *Biochemical and biophysical research communications*, 499 (2), 196-201.
- [23] Calvopina-Chavez, D. G., Gardner, M. A., & Griffitts, J. S. (2022). Engineering efficient termination of bacteriophage T7 RNA polymerase transcription. *G3: Genes, Genomes, Genetics*, 12 (6), jkac070.
- [24] McManus, J. B., Emanuel, P. A., Murray, R. M., & Lux, M. W. (2019). A method for cost-effective and rapid characterization of engineered T7-based transcription factors by cell-free protein synthesis reveals insights into the regulation of T7 RNA polymerase-driven expression. *Arch Biochem Biophys*, 674,108045.
- [25] Lundstrom, K. (2007). *Structural genomics and drug discovery*. *Cell*, 11, 224–238.
- [26] Angius, F., Illoiaia, O., Amrani, A., Suisse, A., Rosset, L., Legrand, A., Abou-Hamdan, A., Uzan, M., Zito, F., & Miroux, B. (2018). A novel regulation mechanism of the T7 RNA polymerase based expression system improves overproduction and folding of membrane proteins. *Nature Scientific Reports*, 8, 8572.
- [27] Wang, W., Li, Y., Wang, Y., Shi, C., Li, C., Li, Q., Linhardt, RJ. (2018). Bacteriophage T7 transcription system: an enabling tool in synthetic biology. *Biotechnol Adv*. 36 (8), 2129-2137.
- [28] Tan, SI., & Ng, IS. (2020). New Insight into Plasmid-Driven T7 RNA Polymerase in Escherichia coli and Use as a Genetic Amplifier for a Biosensor. *ACS synthetic biology*, 9 (3), 613-622.
- [29] Sun, XM., Zhang, ZX., Wang, LR., Wang, JG., Liang, Y., Yang, HF., Tao, RS., Jiang, Y., Yang, JJ., & Yang, S. (2021). Downregulation of T7 RNA polymerase transcription enhances pET-based recombinant protein production in Escherichia coli BL21 (DE3) by suppressing autolysis. *Biotechnology and bioengineering*, 118 (1):, 153-163.
- [30] Zhang, G., Yang, J., Qin, F., Xu, C., Wang, J., Lei, C., Hu, J., & Sun, X. (2019). A Reverse Genetics System for Cypovirus Based on a Bacmid Expressing T7 RNA Polymerase. *Viruses*, 11 (4), 314-315.